

Onkologi:

Ad 1: Dato for modtaget henvisning i onkologisk afdeling.

Ad 2: Der er her mulighed for at registre evt. øget ventetid. Hvis der vælges "Ja" skal man også anføre hvad årsagen hertil er.

Ad 3: Oplysningerne i dette felt skal inddateres af brugerne. Kan ikke aktuelt hentes i LPR. ECOG Performance status (Eastern Oncology Group Performance Status scale). Ref.: Am J Clin Oncol 1982; 5: 649-55.

Ad 4: Her er anført en patologidiagnose hvis søgning i Patologiregisteret (Patobank) finder, at der er foretaget histo- eller cytologiske undersøgelser, der viser primær lungecancer. Er feltet tomt er dette enten ikke tilfældet eller samkøringen med Patobank er endnu ikke foretaget."

Ad 5: Oplysningerne er hentet i LPR. Her er anført resultatet af registrerede TNM-klassifikationer i onkologiforløbet på behandlingstidspunktet. For hver registrerede T, N og M er anført den værdi med højeste score. Kan evt. rettes".

• T-klassifikation

- Tx Maligne celler, ingen tumor.
- T0 Ingen Tumor, ingen maligne celler.
- Ta Tumor uden invasion.
- Tis Carcinoma in situ.
- T1a vælges ved tumorer ≤ 2 cm, omgivet af lunge eller pleura viscerale, ikke i hovedbronkus.
- T1b vælges ved tumorer ≤ 3 cm, omgivet af lunge eller pleura viscerale, ikke i hovedbronkus.
- T2a vælges ved tumorer > 3 cm og ≤ 5 cm, i hovedbronkus mere end 2 cm fra carina, i pleura viscerale, partiel atelektase.
- T2b vælges ved tumorer > 5 cm og ≤ 7 cm, i hovedbronkus mere end 2 cm fra carina, i pleura viscerale, partiel atelektase.
- T3 vælges, når tumor invaderer brystvæggen, diagfragma, mediastinum pleura, pericardie, mindre end 2 cm fra carina uden at involvere carina, total atelektase, metastase i samme lap og ved tumorer > 7 cm.
- T4 vælges, når tumor involverer mediastinum, hjerte, store kar, trachea, esophagus, columna, carina, eller ved tumorer i samme lunge.

• N-klassifikation

- N0 Ingen malignitetssuspekterede glandler
- N1 Peribronchiale eller hilære glandler
- N2 Mediastinale ipsilaterale og subcarinale glandler.
- N3 Kontralaterale glandler, scalene eller supraclavikulære glandler
- Nx Uoplyst

• M-klassifikation

- M0 Ingen suspekterede fjernmetastaser
- M1a vælges ved metastase i modsidige lunge
- M1b vælges ved fjernmetastase til stede (i organer eller lymfeknuder)
- Mx Uoplyst

Ad 6: Oplysningerne stammer fra LPR og kan evt. rettes/tilføjes. "Startdato" er den 1. registrerede behandlingsdato. Hvis der er givet stråleterapi er der anført "Ja" og brugeren kan udfylde antal fraktioner (mellem 1 og 99) og total dosis i GY (mellem 1 og 99).

Hvis der er givet kemoterapi eller anden aktiv onkologisk behandling vælges "Ja" i feltet. Feltet "Behandlingsintensjon" skal udfyldes af brugeren.

Spørgsmål kan rettes på telefon:
eller på e-mail:

6541 1565
ouh.ode.t.dlcr@rsyd.dk